

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS.

SALA 4.^a

CAMA NÚM. 40

CLÍNICA DEL DOCTOR CASTELO.

Bubones fistulosos en las regiones inguinales.—Flemon en la region hipogástrica y subpubiana, con edema escrotal.

A. R. del C., de 32 años, temperamento linfático-nervioso, constitucion regular, salud habitual buena, aunque de malas costumbres, ingresó el 21 de Setiembre de 1879.

Sin antecedentes de familia. A los 20 años tuvo un bubon en la region inguinal derecha; estuvo despues en diferentes épocas bajo la influencia de otro bubon y diferentes blenorragias uretrales. Hace cuatro meses se le presentaron de nuevo bubones en ambas regiones inguinales, que supuraron, y léjos de cicatrizar empeoraron hasta llegar al siguiente

Estado actual. — Presenta inflamacion que ocupa uniformemente las regiones hipogástrica y suprapubiana, extendiéndose á las inguinales y escrotal, y en menor extension á la perineal é iliacas; coloracion rosácea general, más roja en la region hipogástrica y suprapubiana; dolores lancinantes espontáneos y provocados por la presion. En el centro de esta tumefaccion, ó sea en el hipogastrio, se percibe una fluctuacion marcada, que indica ya seguramente la existencia de pus. Las regiones inguinales ofrecen orificios supurantes, de bordes lívidos y despegados, que comunican entre sí por trayectos fistulosos subcutáneos, segun puede reconocerse con el estilete. El estado general está bastante debilitado, y el enfermo ofrece un ligero movimiento febril.

Tratamiento y curso. — Lo primero que se hizo fué dar inmediatamente salida al pus por medio de una extensa incision vertical en el hipogastrio, que dió salida á una gran cantidad de pus flegmonoso, de mal carácter. En seguida se le prescribió dieta de caldo, tisana de cebada, y tópicamente, locion y cura tres veces al dia con la disolucion acuosa normal de ácido fénico; y cataplasma de harina de linaza. El 28 del mismo mes se suspendió el anterior tratamiento, y fué sustituido por la cura con pomada de subnitrate de bismuto. Del 3 al 4 del siguiente mes se presentó nuevo flemon en la region inguinal y muslo izquierdo, que dió muy abundante supuracion de mal carácter. Se le puso la compresion ascendente á todo el miembro del lado izquierdo, é inyeccion y cura con la disolucion normal de ácido fénico, y fricciones con alcohol alcanforado. Los múltiples trayectos fistulosos que ya existían, y los que se formaron, hicieron necesarias amplias escisiones para evitar estancaciones purulentas; aplicando la cura con la mezcla de alcohol (dos partes) y colirio de Fernandez (seis partes). Poco se consiguió con este tratamiento, pues las abundantes pérdidas purulentas llevaron al enfermo á un estado de marasmo, consuncion y aniquilamiento de fuerzas tan considerable, que hacia temer por su vida. Se presentaron accesos febriles vespertinos, pulso frecuente y pequeño, inapetencia y depresion general, que indicaban una reabsorcion purulenta temible. El tratamiento tónico, los cocimientos antisépticos, el vino de Jerez, los excitantes locales y generales fueron inútiles, pues el enfermo falleció el dia 15 de Diciembre de 1879.

BOROBIO.