

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS.

SALA 5.<sup>a</sup>

CAMA NÚM. 12.

CLÍNICA DEL DOCTOR OLAVIDE.

Acné varioliforme.

P. V., de 43 años, casado, natural de Valladolid, de oficio sastre, de temperamento nervioso, sin antecedentes morbosos hereditarios. Comenzó hace cinco años su afección por un granito en la punta de la nariz, que le producía sensación de picor en términos que le causaba molestias, obligándole á rascarse y rompiendo las pequeñas vesículas que había en este sitio; después siguió á esto inflamación de toda la punta de la nariz, localizándose en este sitio sin que diera lugar á perturbaciones de la sensibilidad; de una manera lenta la tumefacción extendió sus límites á las alas de la nariz, surcos naso-genianos y naso-labiales, circunscribiéndose por la parte superior al reborde infraorbitario por las partes laterales á ambas mejillas, y por último á la barba. En el largo espacio de cinco años que cuenta este padecimiento no ha sufrido notables variaciones, sin embargo de que las extremas temperaturas y la excitación producida por los agentes mecánicos, calor y luz, hacían aumentar el estado flogístico. Debemos hacer constar que (según relación del enfermo) la erupción desapareció casi por completo bajo la influencia de su clima natal, coincidiendo con esto gastralgias, corizas, catarros gastro-intestinales, por cuya razón volvió de nuevo á esta Corte para poner alivio á su dolencia; ya durante este tiempo hizo uso de multiplicados remedios, entre ellos los alterantes al interior, y tópicamente el ácido fénico, el aceite de enebro, las pomadas antiherpéticas, la glicerina, etc., y por último se decidió á ingresar en este hospital el día 3 de Febrero, presentando el siguiente

**Estado actual.** — Sobre una zona cuya superficie tiene un color rojizo se observan elevaciones y hundimientos de forma irregular, indicios de cicatrices consiguientes á pérdidas de sustancia, si no muy extensas si muy numerosas; á este conjunto deben añadirse costras secas y adherentes de un color blanquecino con descamación furfurácea de sus bordes, sin exudación purulenta y si ligeramente serosa, las cuales determinaban ligerísima sensación de picor, sobre todo en aquellos sitios donde hay pelo: en el lado izquierdo de la cara está mucho más manifiesta la lesión que en el derecho, en el cual las cicatrices son deprimidas y análogas á las que resultan de una erupción varioliforme; en el labio superior y región mentoniana se hacen visibles aún pequeños granos rojos diseminados en unas partes, confluentes en otras, duros y rojizos, continuándose hasta la región infraídea en donde se manifiestan otras cicatrices longitudinales, blancas cual si fueran de quemadura. En el antebrazo izquierdo se observa una ulceración circular de unos cuatro centímetros de diámetro en vías de cicatrización, en la cual se advierte una película blanca, escamosa, de los puntos regenerados, y en la extremidad inferior del antebrazo derecho una erupción granulosa, difusa y compuesta de pequeños granos, rojos, duros y puntiagudos.

**Tratamiento.** — Ración con vino, aceite de hígado de bacalao y jarabe de ioduro de hierro aa. 30 gramos para tomar en dos dosis, lavatorio á la erupción con la disolución acuosa normal de ácido fénico; cuyo tratamiento fué sustituido por lavatorios con agua de zaragatona, toques con la tintura de iodo y administración repetida de los purgantes salinos suaves.

Se presentaron más tarde complicando la enfermedad gastralgias que produjeron al enfermo dolores violentos y vómitos frecuentes, lo cual hizo necesaria la administración de los anodinos con el cloruro mórfico y el uso de los alcalinos en mixtura bajo la forma siguiente:

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| De agua de azahar . . . . .     | 100 gramos.    |
| » cloruro mórfico. . . . .      | 25 miligramos. |
| » bicarbonato de sosa . . . . . | 6 gramos.      |

Disuélvase para tomar por cuartas partes, sustituyendo por último á este tratamiento el de los tónicos amargos: infusión de genciana 150 gramos para tomar en dos dosis antes de cada comida.

A beneficio de todo lo cual, en un estado completamente satisfactorio, tomó el alta el día 24 de Abril de 1881.

PALACIOS.