

CONSULTA Y CURA PÚBLICA.

DOCTOR MOISÉS SANJUAN.

Úlcera secundaria en el dedo gordo del pié izquierdo.

M. de S., de 28 años de edad, soltero, jornalero, natural de Yuncillos, provincia de Toledo, de temperamento sanguíneo, bien constituido, sin antecedentes hereditarios morbosos, se presentó en esta Consulta y Cura pública el día 14 de Marzo de 1883 para tratarse una lesión ulcerosa del dedo gordo del pié izquierdo.

Un mes hacia ya próximamente que le había empezado la enfermedad, siendo sus primeros síntomas dolor moderado en la articulación, tumefacción y rubicundez de la piel correspondiente á dicho dedo, notando á los cuatro días que se formaba una pustulita del tamaño de una lenteja en la raíz de la uña, la cual se fué extendiendo todo alrededor de aquella; con un alfiler dió salida al pus que la pústula contenía; pero no tardó mucho en volverse á llenar, en tanto que la uña se desprendía desde su raíz al borde libre.

Preguntado el enfermo por la causa de su lesión, nos dijo que no sabía á qué achacarlo, aunque si bien tres meses antes había padecido una úlcera en el miembro que tardó bastante tiempo en curarse; reconocido el sitio que aquella había ocupado, se podía desde luego apreciar el sífiloma bastante manifiesto, pero ningún otro fenómeno secundario pudo hallarse.

El estado de la lesión que fué causa de presentarse en la referida Consulta, era tal y conforme se representa en el modelo en el momento de practicar el reconocimiento.

La uña había desaparecido y en su lugar quedaba una ulceración de color rojo vivo, de fondo granuloso y muy sensible, de bordes despegados y blanquecinos, duros y limitados hacia fuera por una tumefacción de la piel bastante dura é indolente; dicha úlcera no solamente ocupaba el sitio de implantación de la uña, sino también parte de la cara interna del dedo gordo, afectando la forma circular y poco profunda. El dolor que le ocasionaba al enfermo era poco y no dificultaba apenas la progresión.

Se le dispuso lavatorio y cura con el colirio de Fernández reformado de la F. E. á la ulceración, y al interior una píldora de protoioduro de mercurio y tridacio, desapareciendo á los pocos días, sin que se pudiera saber el curso de la enfermedad, ni si se curó ó empeoró.