

# HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS

## CONSULTA DE DERMATOLOGÍA Y SIFILIOGRAFÍA

### CLÍNICA DEL DOCTOR AZÚA

Sifilide pápulo-tuberculosa circinada en grupos; pigmentaciones en el centro de algunos grupos, consecutivas á la evolución de las lesiones primitivas de los mismos.

Este caso es un buen ejemplo por una parte del crecimiento excéntrico de las lesiones sifilíticas, y por otra, de que este crecimiento excéntrico en unas ocasiones se hace como sucede en la lesión de la cara anterior de la pierna por extensión periférica de los bordes de una misma lesión, y en otras como lo demuestra la agrupación de la cara interna é inferior del muslo por la aparición de lesiones nuevas, circulares y concéntricas á las primitivas. El diagnóstico hecho, atendiendo tan sólo á los caracteres objetivos de la lesión y á cicatrices redondas y pigmentadas que tenía en la otra pierna, se confirmó por el éxito rápido y completo que se obtuvo con el yoduro potásico. Las lesiones evolucionaron sin ulcerarse. Las lesiones correspondientes á las cicatrices de la otra pierna evolucionaron al parecer en forma gomosa. Demuestra esto la posibilidad muchas veces notada de la coexistencia y aun de la presentación de sifilides de este tipo después de lesiones gomosas.

La fecha de infección no se pudo precisar, ni tampoco el tiempo en que se presentaron los fenómenos secundarios; parece no ha sido nunca tratada la enferma; el estado general bueno.

Azúa