

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS

CONSULTA DE DERMATOLOGÍA Y SIFILIOGRAFÍA

CLÍNICA DEL DR. AZÚA

Eritema multiforme exudativo: variedad eritema iris vesiculoso

Se modeló esta pieza en los brazos de una mujer de treinta y seis años, casada, de buena salud habitual, sin antecedentes patológicos importantes.

Estando embarazada se inició la enfermedad actual por síntomas febriles intensos, predominando el dolor de cabeza y una hipertermia grande; sin localizaciones genitales. Tres á cuatro días después del comienzo de los fenómenos febriles, aparición simétrica en el dorso de ambas manos de manchas rojo-oscuras, redondas, que tomaron rápidamente aspecto papuloso muy pronunciado con tumefacción difusa del dorso de ambas manos. Continúo el estado febril y aparecieron en los antebrazos, parte inferior de los brazos y cara manchas eritematosas, muchas de ellas perfectamente circulares.

Aparición de vesículas grandes en las manchas, disponiéndose en forma de círculos alrededor del punto central de la mancha, que permanece sin vesícula. Acentuación grande del estado febril y fenómenos gástricos propios de este estado. A los nueve días de comenzada la fiebre y cinco después del principio de la erupción viene á la Consulta. Las lesiones en la cara, en la parte superior de los brazos y en el dorso de las manos, eran papulosas, con formas más ó menos circinadas, y en todas se comprobaba una coloración rojo-oscuro intensa con ligera tinta azulada en la parte más central de cada pápula eritematosa: en los antebrazos y parte inferior de los brazos existían las lesiones representadas en el modelo; la formación de éstas se hacía del siguiente modo: aparición de una mancha eritematosa redonda, elevación de la superficie roja y aparición de un círculo de vesículas que rodeaba la parte central, después nuevo círculo de vesículas externo al primero y crecimiento de la placa por los bordes; posteriormente en algunas aparición hasta de un tercero ó cuarto círculo vesiculoso. Conforme se desarrollaban unos círculos las vesículas de los anteriores se aplanaban, reabsorbiéndose incompletamente el exudado; se unían unas vesículas con otras y engendraban el aspecto irisado amarillo-verdoso y rojizo que se ve en el modelo. El epidermis de la parte central, no invadido al principio por el proceso de vesiculación, acababa por ser levantado al final cuando se fusionaban unas vesículas con otras; el examen de la enferma no demostró localización del proceso en ninguna víscera. Orina sin albúmina. No hay localizaciones articulares. El día de la primera inspección (9.º de enfermedad) comienza á notarse en los pies, piernas, y muslos manchas eritematosas y dolorimiento de los miembros.

Se aconseja permanencia en la cama y un gramo de sulfato de quinina cada veinticuatro horas.

Cuatro días después es vista la enferma en su domicilio por el Sr. Romero, Jefe clínico de la Consulta, y manifiesta ha mejorado el estado general, disminuído los dolores de las piernas y héchose exudativas y circinadas muchas de las lesiones de las piernas. Existen en éstas, por lo tanto, lesiones eritematosas, papulosas, pápulo-vesiculosas en círculo y aisladas.

Sigue la misma medicación. Tres días después sigue la mejoría y se conserva la evolución de las alteraciones cutáneas en su marcha normal. Quince á veinte días después volvió la enferma á la Consulta con descamación abundante de la piel en los sitios invadidos por lesiones eritematosas y con costras delgadas en las partes que habían exudado, todas las que en su mayoría estaban ya secas.

El descenso de la enfermedad había sido rápido y franco, y en conjunto puede evaluarse la duración total en un plazo de seis semanas.

Puede considerarse el caso como un tipo de eritema multiforme exudativo intenso, acompañado de fenómenos febriles altos, pero evolucionando sin localización visceral ninguna y sin verdadera gravedad. No hubo lesiones en las mucosas.

Respecto á la etiología sólo puede apreciarse la condición predisponente del estado de embarazo y una perturbación moral grave experimentada por la enferma pocos días antes de aparecer la enfermedad.

Dada la influencia del sistema nervioso en este género de lesiones, puede estimarse como de valor verdadero este dato; el embarazo siguió su curso normal.