

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS.

SALA 12.

CAMA NÚM. 11.

CLÍNICA DEL DOCTOR OLAVIDE.

Sifilide pápulo-tuberculosa circunscrita.

E. L., de 25 años, soltera, natural de Madrid, temperamento nervioso, constitucion regular, sin que haya claros antecedentes por las respuestas negativas que á todas las preguntas daba la enferma, ingresó en este Hospital el día 5 de Octubre de 1880.

Preguntada por la manera que tuvo de presentarse la erupcion que el modelo expresa, y que es la única que en la enferma se veía, dijo haber tenido en su principio unos pequeños granitos duros, nada molestos y que poco á poco fueron creciendo en términos de adquirir en tres meses, poco más ó ménos, el tamaño y figura con que actualmente se presenta. Si hubo ó dejó de haber infeccion sifilítica y lesion inicial, ni lo sabemos, ni la interesada está por decirlo; en su consecuencia el estado actual, tal y como puede verse en el modelo, nos va á ocupar: en la eminencia frontal derecha y en la region infraóideia del mismo lado se ven claras y distintas dos pápulas del tamaño de dos reales de plata completamente circulares y conservando el epidérmis que las cubre de un color rojovinoso; pequeñas depresiones en la convexidad, hacen que se umbiliquen en varios sitios y las dan un aspecto poco uniforme; son completamente secas, duras, no dolorosas ni pruriginosas, y no pierden ni la forma ni la coloracion cuando se comprimen con el dedo.

De igual naturaleza que las que acabamos de describir se observa otra excesivamente grande sobre la region superciliar é infraorbitaria, la cual, en su principio, debió estar compuesta de otras más pequeñas y que por sucesivos crecimientos se han confundido y formado la magnitud tuberculosa que adopta en su medida transversal, encima del ojo como seis centímetros, dos y medio por debajo, y en toda su altura igual medida que la correspondiente al mayor diámetro transversal; no es completamente circular, sino elíptica en la porcion supra-orbitaria, y más que tuberculosa es una franja coloreada en la porcion infra-orbitaria.

Tratamiento. — Racion. Dos píldoras de protoioduro de mercurio y tridacio (fórmula de este Hospital) para tomar una por la mañana y otra por la tarde; untura á los tubérculos con la pomada de ioduro mercurioso. A pesar de no habersele administrado más de seis píldoras en los tres dias siguientes, hubo necesidad de suspenderlas á consecuencia de unos fuertes dolores cólicos seguidos de diarrea, que hicieron necesaria la administracion del extracto tebaico en píldoras de 25 miligramos y agua gomosa para bebida usual.

Sin que hubiera tiempo para emprender de nuevo el tratamiento suprimido á causa de la complicacion, la enferma pidió el alta el día 13 de Octubre en el mismo estado y sin variacion alguna.

PALACIOS