

## HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS.

SALA 13.

CAMA NÚM. 11.

## CLÍNICA DEL DOCTOR OLAVIDE.

## Apéndice córneo de la mejilla izquierda.

J. R. y L., de 55 años, soltera, natural de Brunete (Madrid), oficio quehaceres domésticos, temperamento sanguíneo-nervioso y buena constitucion, entró el 10 de Noviembre de 1879.

Sin antecedentes de familia. Bien reglada hasta los 46 años, gozó siempre de buena salud. Hace 24 años le salió una mancha en la mejilla izquierda, de color oscuro, sin elevacion y con algun picor, que más tarde se cubrió de una escama blanca córnea, que aumentaba en espesor, se desprendía y se podía cortar impunemente cual si fuese una uña. Le cauterizaron y cortaron repetidas veces, pero siempre se reproducia, si cabe, con más intensidad.

**Estado actual.**—Presenta en la region malar izquierda un apéndice ó escrecencia, que tiene una base de dos centímetros y medio, por una elevacion sobre el nivel de la piel de otros dos centímetros. Su forma es irregularmente cónica, su color pardo negruzco, su consistencia dura y enteramente córnea; puede desprenderse por su base de la piel subyacente, excepto por un pequeño punto de la parte superior que siempre permanece adherido. Este apéndice es indolente en absoluto y puede cortarse como una uña, sin que dé la menor muestra de sensibilidad. La piel circundante forma una aureola rojiza y ligeramente tumefacta. Cuando se levanta ó desprende el apéndice córneo, queda una superficie cubierta de una escama blanca y seca. El estado general es enteramente satisfactorio.

**Tratamiento.**—Desde el dia de su entrada se le dispuso la pomada de ácido pirogálico (1 1/2 gramos por 30 de manteca), y cataplasma de harina de arroz, con lo cual se fué desprendiendo por capas hasta quedar reducido el apéndice córneo á la tercera parte. Ya en este estado, se le aplicó parche de emplasto de Vigo con mercurio, alternando con unturas de glicerina pura. En 14 de Diciembre se volvió á usar la pomada de ácido pirogálico. El 17, locion de disolucion de bicarbonato sódico al 10 por 100, antes de la untura de ácido pirogálico. Suspendida esta, se espolvoreó la parte con bicarbonato sódico, el dia 21 de Enero. En 11 de Febrero se suspendió el bicarbonato, reemplazándole con los toques de tintura alcohólica de iodo.

Al interior estuvo tomando desde su entrada dos píldoras diarias de arseniato de hierro, de 50 miligramos cada una.

El 13 de Marzo salió con alta pedida en muy satisfactorio estado. Había desaparecido el apéndice córneo, quedando tan sólo en su sitio una ligera cicatriz.

BOROBIO.