

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS.

SALA 13

CAMA NÚM. 10.

CLÍNICA DEL DOCTOR OLAVIDE.

Varioloide en una niña.

F. A. A., natural de Buron (Leon), de 8 años, de temperamento linfático y constitucion débil, ingresó el día 5 de Julio de 1879.

Sin antecedentes de familia. Desde hace dos años padece una tiña favosa que tiene su asiento en el cuero cabelludo y presenta los caracteres típicos, por cuya enfermedad vino á este hospital, en el cual se la trató con los medios terapéuticos adecuados. Como quiera que el objeto de la presente historia es tan sólo la erupcion de varioloide que de un modo intercurrente se la presentó durante su estancia en la sala, pues á ella se refiere el modelo existente en el Museo, hemos de prescindir por completo de la tiña favosa que padece la niña, limitándonos á describir la varioloide.

El día 4 de Octubre se le presentaron los prodromos de un estado febril, caracterizado por cefalalgia, postracion, malestar, inapetencia, sed, aumento de calor y pulso frecuente. Como existían á la vez en la enfermeria cuatro casos de viruela, se temió tambien fuese acometida esta enferma; y en efecto, al día siguiente apareció ya la erupcion con los caracteres siguientes: pústulas de ancha base, redondas, poco elevadas, con gran auréola roja que las circunda y una vesícula que forma su vértice, ligeramente umbilicada alguna y otras sin la menor umbilicacion; el contenido de las vesículas es opaco, purulento. La erupcion ocupa todo el cuerpo, pero las pústulas están muy discretas y la piel de los intervalos es normal. Acompaña á la erupcion un estado general febril claro y manifiesto, pero sólo de mediana intensidad.

Tratamiento y curso.—No nos ocuparemos del de la tiña favosa por no ser este el objeto de la presente historia.

El día 8 de Octubre, verificada ya la erupcion con todos sus caracteres, se le dispusieron toques á la misma, tres veces al día, con el alcohol fénico, que á los cinco días se suspendieron, sustituyéndolos por lociones con la disolucion normal de ácido fénico, y más tarde polvos de almidon. La varioloide siguió un curso perfectamente normal y sin el menor accidente que reclamase ninguna medicacion interna, mas que una infusion teiforme. Repuesta de esta enfermedad y curada de la tiña que originó su entrada en este hospital, se la dió de alta el día 28 de Marzo de 1880.

ACIN.