

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS.

SALA 5.^a

CAMA NÚM. 20.

CLÍNICA DEL DOCTOR OLAVIDE.

Varicela en un niño á los siete dias de la erupcion.

J. de A., natural de Madrid, de 8 años, hijo de padres desconocidos y acogido en el Hospicio de esta Corte, de temperamento linfático y constitucion débil, ingresó el dia 1.º de Setiembre.

Sin antecedentes de familia ni individuales. Los de la enfermedad se reducen tan sólo á lo siguiente: tres dias ántes de su entrada en este hospital se sintió con malestar general, postracion, calentura, inapetencia, etc., cuyo estado general fué seguido de la presentacion de una erupcion en toda su piel, en vista de la cual fué trasladado á este establecimiento.

Estado actual. — La erupcion ocupa toda la superficie cutánea (el modelo representa tan sólo las nalgas) y está formada por vesículas discretas y aisladas, escasas en número y separadas por una piel enteramente normal. Las vesículas son redondeadas, de base ancha y rodeada de una auréola roja muy marcada; cada vesícula, llena de un líquido blanco-amarillento, tiene el vértice muy opaco y concreto, cubierto por una costrita oscura y adherente. Las vesículas no están umbilicadas. En algunos puntos como en la cara, el contenido de las vesículas se va desecando del todo y produciendo costras más gruesas y oscuras. Por el contrario, en las extremidades inferiores no han adquirido todavía su completo desarrollo y están reducidas á una elevacion papulosa ó á una simple mancha roja. Acompaña á esta varicela un estado ligeramente febril.

Tratamiento. — Presentando la erupcion su tipo normal y un carácter benigno, no fué necesaria la menor intervencion terapéutica, limitándose el tratamiento á cubrir la erupcion con polvos de almidon. Ningun otro tratamiento tópico ni interno se empleó. Con lo cual el enfermo salió perfectamente curado el dia 20 de Setiembre.

BOROBIO.